

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 15.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetésével mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel és/vagy hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.


Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha az útmutatóban egy **megjegyzés** zárójelben szerepel, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. **Mértékegység hiánya esetén** csak akkor jár pontlevonás, ha a hiányzó mértékegység válaszban vagy mértékegység-átváltásban szerepel (zárójel nélkül).
7. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
10. Az olyan részszerkesztésekért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
11. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el**: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**
12. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
13. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
14. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **ésszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
15. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1.		
$A \cap B = \{1; 2; 4\}$	1 pont	
$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 8\}$	1 pont	
$A \setminus B = \{3\}$	1 pont	
Összesen:	3 pont	

2.		
Egy megfelelő gráf, például:		
	2 pont	<i>Nem egyszerű gráf is elfogadható.</i>
Összesen:	2 pont	

3.		
$(22 + 17 - 30 =)$ 9-en vásároltak mindkét fajta kenyérből.	2 pont	
Összesen:	2 pont	

4.		
$a_4 = \left(\frac{6+36}{2}\right)_{21}$	2 pont	$d = 5$
Összesen:	2 pont	

5.		
D	2 pont	<i>Nem bontható.</i>
Összesen:	2 pont	

6.		
$\left(\frac{8 \cdot 5}{2}\right)_{20}$	2 pont	
Összesen:	2 pont	

7.		
A súlyvonal felezi az 5 cm-es oldalt.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A Pitagorasz-tétel alapján $s^2 = 2,5^2 + 6^2$.	1 pont	
A súlyvonal hossza $s = 6,5$ cm.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

8.		
Akkor lesz 4-gyel osztható a szám, ha 24-re, 32-re vagy 52-re végződik.	1 pont	3524, 5324, 4532, 5432, 3452, 4352
Mindhárom esetben 2-féle szám képezhető.	1 pont	
Tehát összesen $2 \cdot 3 = 6$ megfelelő szám készíthető.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

9.		
Bélának $\left(\frac{6500}{5} \cdot 4 =\right)$ 5200 pontja van.	2 pont	
Összesen:	2 pont	

10.		
(Mivel a jegyek átlaga 4, így a jegyek szórása $\sqrt{\frac{4 \cdot 1^2}{8}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 0,707$.)	2 pont	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
Összesen:	2 pont	

11.		
A kvóciens $10^3 = 1000$.	1 pont	
Az első tag $\left(\frac{a_8}{q} = \frac{10^{20}}{(10^3)^7} = \frac{10^{20}}{10^{21}} =\right) 10^{-1} = 0,1$.	2 pont	
Összesen:	3 pont	

12.		
A két kockával 36-félét dobhatunk (összes eset).	1 pont	
A dobott számok összege 4 vagy 9 lehet, a lehetséges dobások: 1-3, 2-2, 3-1, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3. Így a kedvező esetek száma 7.	2 pont	
A kért valószínűség $\frac{7}{36} \approx 0,194$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

II. A

13. a)		
Az egyenletben szereplő törteket közös nevezőre hozva $\frac{5x+15}{20} + \frac{4x+4}{20} = -\frac{10x}{20}$.	2 pont	<i>Ezek a pontok akkor is járnak, ha a vizsgázó az egyenlet mindkét oldalát helyesen szorozza meg 20-szal.</i>
Az egyenletet rendezve: $9x + 19 = -10x$.	1 pont	
$x = -1$	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

13. b)		
$b(60) = 6 \cdot 1,015^{60} \approx 14,7$ ezer	2 pont	
Összesen:	2 pont	

13. c)		
Megoldandó a $600 = 6 \cdot 1,015^p$ egyenlet.	1 pont	
Ebből $100 = 1,015^p$.	1 pont	
$p = \log_{1,015} 100 \approx 309$ perc	1 pont	$p = \frac{\lg 100}{\lg 1,015}$
Tehát a 6. órában éri el a becslés szerint a baktériumok száma a 600 ezret.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

14. a)		
$f(2,5) = ((2,5 - 3)^2 - 4) - 3,75$	2 pont	
Összesen:	2 pont	

14. b)		
Megoldandó az $(x - 3)^2 - 4 = 0$ egyenlet.	1 pont	
$x^2 - 6x + 5 = 0$	1 pont	$ x - 3 = 2$
A zérushelyek: $x = 1$ és $x = 5$.	2 pont	
Összesen:	4 pont	

14. c)		
$d_{PQ} = \sqrt{(6 - 2)^2 + (5 - (-3))^2} = \sqrt{80} \approx 8,94$	2 pont	
Összesen:	2 pont	

14. d) első megoldás		
Az egyenes meredeksége: $m = \left(\frac{5 - (-3)}{6 - 2} \right) = 2$.	2 pont	
Az $y = 2x + b$ egyenletbe például P koordinátáit helyettesítve $-3 = 2 \cdot 2 + b$,	1 pont	<i>Az $y - y_0 = m(x - x_0)$ egyenletbe helyettesítve a megfelelő értékeket:</i>
amiből $b = -7$. Tehát $y = 2x - 7$.	1 pont	$y + 3 = 2(x - 2)$ vagy $y - 5 = 2(x - 6)$.
Összesen:	4 pont	

14. d) második megoldás		
Az egyenes egyenletét $y = mx + b$ alakban keresve megoldandó a következő egyenletrendszer: $\left. \begin{array}{l} -3 = m \cdot 2 + b \\ 5 = m \cdot 6 + b \end{array} \right\}$	1 pont	
Ebből (például a második egyenletből kivonva az elsőét és rendezve) $m = 2$,	2 pont	
majd $b = -7$, így az egyenes egyenlete $y = 2x - 7$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

14. d) harmadik megoldás		
Az egyenes egy irányvektora $\overline{PQ} = (6 - 2; 5 - (-3)) = (4; 8)$.	2 pont	<i>Az egyenes egy normálvektora $(8; -4)$.</i>
Az egyenes egyenlete $8x - 4y = 28$.	2 pont	
Összesen:	4 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó a két pontra illeszkedő egyenes egyenletére vonatkozó képletbe jól helyettesít be, és az alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.

15. a)		
A paralelogramma területe: $T_{ABCD} = 5 \cdot 6 \cdot \sin 70^\circ \approx$	1 pont	<i>A paralelogramma AB oldalhoz tartozó magassága $m = 5 \cdot \sin 70^\circ \approx 4,7$ cm.</i>
$\approx 28,2 \text{ cm}^2$.	1 pont	$T = 6 \cdot 4,7 = 28,2 \text{ cm}^2$
Összesen:	2 pont	

15. b)		
A koszinusztétel alapján $BD^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos 70^\circ \approx 40,48$.	1 pont	
$BD \approx 6,36$ cm	1 pont	
A szinusztétel alapján: $\frac{\sin \beta}{\sin 70^\circ} = \frac{5}{6,36}$,	1 pont*	$\sin \beta = \frac{m}{BD} = \frac{4,7}{6,36}$
amiből $\sin \beta \approx 0,7388$.	1 pont*	
Ebből $\beta \approx 47,6^\circ$ (a kiegészítő szög $132,4^\circ$, ami nem lehetséges).	1 pont	
A másik ismeretlen szög: $\gamma = 180^\circ - 70^\circ - 47,6^\circ = 62,4^\circ$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

*A *-gal jelölt 2 pontot a vizsgázó a következő gondolatmenetért is megkaphatja:*

$5^2 = 6^2 + 6,36^2 - 2 \cdot 6 \cdot 6,36 \cdot \cos \beta$	1 pont	
$\cos \beta \approx 0,6741$	1 pont	

15. c)		
Az állítás hamis.	1 pont	
Megfelelő ellenpélda megadása (egy olyan húrtrapéz vagy deltoid, amely nem paralelogramma).	1 pont	
Összesen:	2 pont	

15. d)		
Az állítás megfordítása: Ha egy négyszög középpontosan szimmetrikus, akkor tengelyesen is szimmetrikus.	1 pont	
Az állítás hamis.	1 pont	
Megfelelő ellenpélda megadása (egy olyan paralelogramma, amely nem rombusz és nem is téglalap).	1 pont	
Összesen:	3 pont	

II. B

16. a) első megoldás		
1 kg kristálycukor árát forintban jelölje k , 1 kg barna cukorét b . Ekkor a feladat szövege alapján: $\left. \begin{aligned} 4k + b &= 2600 \\ 3k + 2b &= 3275 \end{aligned} \right\}$	1 pont	
Az első egyenletből $b = 2600 - 4k$.	1 pont	<i>Az első egyenletet 2-vel megszorozva,</i>
Ezt a második egyenletbe helyettesítve $3k + 5200 - 8k = 3275$.	1 pont	<i>és ebből a második egyenletet kivonva $5k = 1925$.</i>
Innen $k = 385$ (1 kg kristálycukor ára 385 Ft),	1 pont	
és $b = (2600 - 4 \cdot 385 =) 1060$ (1 kg barna cukor ára 1060 Ft).	1 pont	
Ellenőrzés a szövegbe helyettesítéssel.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

16. a) második megoldás		
Mivel Emese mindkét esetben 5 kg cukrot vesz, csak a második esetben 1 kg kristálycukrot 1 kg barna cukorra cserél, ebből következik, hogy 1 kg barna cukor $3275 - 2600 = 675$ Ft-tal drágább 1 kg kristálycukornál.	2 pont	
Tehát, ha 1 kg kristálycukor ára k Ft, akkor $4k + k + 675 = 2600$.	1 pont	
Azaz $k = 385$ (1 kg kristálycukor ára 385 Ft),	1 pont	
és $385 + 675 = 1060$ Ft 1 kg barna cukor ára.	1 pont	
Ellenőrzés a szövegbe helyettesítéssel.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

16. b)		
$1 \text{ uncia} = \frac{1}{35,3} \text{ kg} \approx 0,0283 \text{ kg} = 28,3 \text{ g}$	1 pont	$1 \text{ uncia} = \frac{1000}{35,3} \text{ g} \approx 28,3 \text{ g}$
$5 \text{ uncia} = 141,5 \text{ g}$	1 pont	
Tehát a kért kerekítéssel 140 gramm cukrot kell Emesének kimérnie.	1 pont	<i>Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.</i>
Összesen:	3 pont	

16. c)		
A csomagok száma a 72-nek és a 96-nak is osztója, ezért a 72 és a 96 legnagyobb közös osztóját kell meghatározni.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$72 = 2^3 \cdot 3^2$	1 pont	<i>72 osztóinak felsorolása.</i>
$96 = 2^5 \cdot 3$	1 pont	<i>96 osztóinak felsorolása.</i>
Tehát Emese legfeljebb $(72; 96) = 24$ csomagot tud összeállítani a feltételeknek megfelelően.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó helyesen válaszol, de nem indokolja, hogy 24-nél több csomagot nem lehet összeállítani, akkor 2 pontot kapjon.

16. d)		
Az összes eset száma $\binom{25}{5} = 53\,130$.	1 pont	
A kedvező esetek száma $\binom{10}{2} \binom{15}{3} = 20\,475$.	2 pont	
A kérdéses valószínűség: $\frac{20\,475}{53\,130} \approx 0,385$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	


17. a) első megoldás		
A 3-as méretű labda sugara 9 cm, az 5-ös méretű labda sugara 10,75 cm.	1 pont	
A 3-as méretű labda térfogata $\frac{4}{3} \cdot 9^3 \cdot \pi \approx 3054 \text{ cm}^3$,	1 pont	
az 5-ös méretű labda térfogata $\frac{4}{3} \cdot 10,75^3 \cdot \pi \approx 5204 \text{ cm}^3$.	1 pont	
A térfogatok aránya $\frac{5204}{3054} \approx 1,7$,	1 pont	
tehát az 5-ös méretű labda térfogata kb. 70%-kal nagyobb, mint a 3-as méretű labda térfogata.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

17. a) második megoldás		
Bármely két gömb hasonló.	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.</i>
Hasonló testek térfogatának aránya a hasonlóság arányának a köbével egyenlő.	1 pont	
A 3-as és 5-ös labdák esetében a hasonlóság aránya $\frac{21,5}{18} \approx 1,194$,	1 pont	
így a térfogatok aránya $1,194^3 \approx 1,7$.	1 pont	
Az 5-ös méretű labda térfogata kb. 70%-kal nagyobb, mint a 3-as méretű labda térfogata.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

17. b) első megoldás		
Minden csapat három mérkőzést játszott a csoportkörben.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Amelyik csapat 7 pontot szerzett, az biztosan (kétszer nyert, és) egyszer játszott döntetlent. Amelyik 5 pontot szerzett, az biztosan (egyszer nyert, és) kétszer játszott döntetlent. Amelyik 4 pontot szerzett, az biztosan (egyszer nyert, egyszer veszített, és) egyszer játszott döntetlent. (Amelyik csapat 0 pontot szerzett, az háromszor kikapott.)	2 pont	
Tehát (a 4 döntetlen csapateredmény miatt) a mérkőzések közül kettő végződött döntetlenre.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

17. b) második megoldás		
Egy csoportban $\left(\frac{4 \cdot 3}{2} =\right) 6$ mérkőzést játszanak.	1 pont	
Ha a csoportban nincs döntetlen, akkor minden mérkőzésen összesen 3 pontot szerez a két csapat, tehát ebben az esetben 18 lenne a pontszámok összege. Minden döntetlenül végződő mérkőzés ezt a pontszámot 1-gyel csökkenti (mert összesen 3 helyett csak $1 + 1 = 2$ pontot szereznek a csapatok a mérkőzésen).	1 pont	
A megadott esetben a pontszámok összege 16,	1 pont	
tehát a mérkőzések közül kettő végződött döntetlenre.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

17. c)		
Az átlag $\left(\frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 8 \cdot 6 + 3 \cdot 7}{32} =\right) 4,1875.$	2 pont	
Összesen:	2 pont	

17. d)												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>minimum</td> <td>alsó kvartilis</td> <td>medián</td> <td>felső kvartilis</td> <td>maximum</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	minimum	alsó kvartilis	medián	felső kvartilis	maximum	0	3	4	6	7	4 pont	<i>A minimum és a maximum helyes megadása összesen 1, a többi helyesen megadott érték 1-1 pontot ér.</i>
minimum	alsó kvartilis	medián	felső kvartilis	maximum								
0	3	4	6	7								
Jó diagram. 	2 pont											
Összesen:	6 pont											

18. a)		
Ha 12 másodperc alatt 9 felvillanást látunk, akkor 60 másodperc alatt 45-öt látnánk,	1 pont	
azaz elsőfokú viharjelzés van érvényben.	1 pont	
Összesen:	2 pont	

18. b)		
Ha a középső medencében elsőfokú jelzés van, akkor a két szélsőben bármilyen jelzés lehet.	1 pont	
Ez $3 \cdot 3 = 9$ lehetőség.	1 pont	
Ha a középső medencében alap- vagy másodfokú jelzés van, akkor a két szélsőben kétféle lehet.	1 pont	
Ez $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ lehetőség.	1 pont	
Összesen ($9 + 8 =$) 17-féle viharjelzés adható ki a Balaton egészére vonatkozóan.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó az összes lehetséges esetet rendezetten felsorolva helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.

nyugati	0					1					2						
középső	0		1			0		1			2		1			2	
keleti	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	1	2	0	1	2	1	2

18. c)		
A csonkakúp alapkörének sugara $\frac{11000}{2\pi} \approx 1751$ m.	1 pont	
A csonkakúp térfogata: $\frac{330 \cdot \pi}{3} (1751^2 + 1751 \cdot 600 + 600^2) \approx$	1 pont	
$\approx 1\,547\,000\,000 \text{ m}^3 =$	1 pont	
$= 1,547 \text{ km}^3.$	1 pont	
Tehát az állítás igaz.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

18. d)		
Az egyes években megtermelt bormennyiségek (hektoliterben mérve) egy olyan mértani sorozat első tíz tagját alkotják, amelynek hányadosa 1,05, és az első tíz tag összege 1000.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$a_1 \cdot \frac{1,05^{10} - 1}{1,05 - 1} = 1000$	1 pont	
Ebből $a_1 \approx 79,5$ hektoliter az első évre tervezett mennyiség.	1 pont	
A 10. évben pedig $a_{10} = 79,5 \cdot 1,05^9 \approx 123,3$ hektoliter a tervezett termelés.	2 pont	
Összesen:	5 pont	